

INFLUENCIA DE LA VACUNA VPH SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LA NEOPLASIA CERVICAL INTRAEPITELIAL GRADO 1

OBJETIVO: valorar la eficacia de la vacuna del VPH en mujeres diagnosticadas de CIN1 durante los dos últimos años en el Hospital Universitario Ramón y Cajal.

CRITERIOS DE ELECCIÓN:


Mujeres con diagnóstico de neoplasia intraepitelial cervical grado I (CIN1).
Realizado por biopsia cervical en la consulta de patología cervical del Hospital Universitario Ramón y Cajal
Durante los años 2020 y 2021.

DATOS DEMOGRÁFICOS

Edad media
37 años

Fumadoras
43%.


Paridad media 1,2 hijos/mujer



■ Nada ■ Preservativo ■ Met. Hormonal ■ DIU

MÉTODO ANTICONCEPTIVO

RESULTADOS



TIEMPO MEDIO DE CURACIÓN:
15,3 meses vs 18,6 meses

ODDS RATIO DE CURACIÓN:
1,52

CONCLUSIÓN

Aunque se trata de un estudio limitado y no-aleatorio, podemos intuir que la vacuna de VPH es beneficiosa para la curación del CIN1, con una probabilidad de curación en nuestro estudio 1,52 veces mayor que la no-vacuna.

Además, el tiempo medio de curación, en nuestro estudio, fue menor en las pacientes vacunadas.